

 DIREZIONE SERVIZI DIGITALI	NEMBO Portale Caccia Note operative	F411-NEMBO-GUI-079- 20260803_VU Pag. 1 di 7
---	--	--

NEMBO Versione 10.0.0 del 03/08/2026		
N.	Sezione	Descrizione
1	Aziende Venatorie	Implementazione istanze di Richiesta Prove Pratiche anche per le AFV/AATV
2	Aziende Venatorie	Implementazione nuovi controlli RPP01 e RPP02 per le prove cinofile
3	Aziende Venatorie	Implementazione nuovo controllo nelle guardie venatorie sulla data di fine decreto che non sia antecedente alla data corrente
4	Gestione Faunistica	Revisione dei bandi relativi ai piani di prelievo della fauna alpina per l'adeguamento delle linee guida sulla gestione venatoria a quanto previsto dai Piani Nazionali di Gestione del Fagiano di monte, della Coturnice e della Pernice bianca.

1 - Richiesta Prove Pratiche da parte di un'Azienda Venatoria

E' ora possibile inoltrare istanza di richiesta prove pratiche anche direttamente da parte di una AFV/AATV priva di una ZAC presente a sistema.

Servizionline

Aziende venatorie

Home / Ricerca procedimento / Elenco procedimenti / Dettaglio Oggetto / Prova Cinofila

Utente

02101840581 - AATV
2024 - Aziende Venatorie (AFV ed AATV)
Procedimento numero: 23970002426 - Istruttoria richiesta prove pratiche in corso dal 31/07/2026 13:05:12
RICHIESTA PROVE PRATICHE - Trasmesso dal 31/07/2026 13:01:01 - Codice domanda : 23970002426-PP-01

Operazioni

Dati identificativi
Scheda descrittiva
Guardie Venatorie
Prova Cinofila
Dichiarazioni
Allegati
Controlli SIGC (informatici)
Pagamento bollo digitale

Descrizione prova	TEST
Data prova	01/09/2026
Tipo prova	internazionale
Modalità	con sparo
Su selvaggina di allevamento	fagiano permice rossa

Modifica

2 - Nuovi controlli RPP01 e RPP02

Sono stati introdotti due nuovi controlli, applicabili ad entrambe le tipologie di Richieste Prove Pratiche (da parte cioè sia di AFV/AATV che di ZAC).

In particolare, il controllo RPP02 verifica che la data della prova sia prevista ad almeno 20 gg dalla richiesta (ovvero dalla data corrente).


RPP01	Verifica compilazione quadro "Prova Cinofila"
RPP02	Verifica data della Prova Cinofila

3 - Nuovo controllo data fine decreto

In inserimento e/o modifica di una Guardia Venatoria, è stato introdotto un controllo per evitare che si possa impostare come Data Fine Decreto una data antecedente a quella corrente.



Il controllo, già esistente, sulla congruenza temporale delle due date, è stato spostato sulla data di Inizio Decreto.



4 - Revisione dei bandi relativi al censimento dei piani di prelievo della fauna alpina per l'adeguamento delle linee guida sulla gestione venatoria a quanto previsto dai Piani Nazionali di Gestione del Fagiano di monte, della Coturnice e della Pernice bianca.

Per consentire il calcolo della nuova **consistenza post-riproduttiva dei maschi**, si è reso necessario memorizzare negli archivi di Nembo il dato relativo alla **superficie primaverile di distribuzione presente**, fornito dalla Regione Piemonte.

Tale valore è definito per ciascun distretto e per ciascuna specie e può essere aggiornato nel corso degli anni. **Eventuali variazioni saranno comunicate dalla Regione Piemonte e recepite negli archivi di Nembo.**

Sono state effettuate le seguenti modifiche:

Modifica etichette per le tre specie (Fagiano di monte, Coturnice, Pernice Bianca):

- ✓ Numero animali indeterminati --> Numero uccelli indeterminati
- ✓ Numero totale animali indeterminati --> Numero totale uccelli indeterminati
- ✓ Numero totale di animali --> Numero totale di uccelli

Piani di prelievo Fagiano di monte

Sono state inserite le seguenti nuove etichette:

- **Sezione Primaveraile:**
 - ✓ **Superficie di distribuzione** - dato non digitabile, fornito dalla Regione Piemonte
 - ✓ **Numero uccelli indeterminati** - dato da imputare
- **Sezione Estiva:**
 - ✓ **%Totale giovani/Totale uccelli** – dato non digitabile, percentuale così calcolata:

numero totale di giovani / numero totale di uccelli * 100

Sono stati modificati i seguenti calcoli:

- **Sezione Primaveraile**
 - ✓ **Numero totale di uccelli** = numero uccelli indeterminati + numero di maschi + numero di femmine adulte
- **Sezione Estiva**
 - ✓ **Numero maschi a fine estate**

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 0,8 \right] + \left[\frac{A * S_r * 0,9}{2} \right]$$

Dove:

Nmtot= Numero maschi totale;

Nmprim= Numero maschi contati a primavera;

Sprimdis= Superficie primaveraile di distribuzione (solo superficie venabile);

Sprimind= Superficie primaveraile indagata (solo superficie venabile);

Sr= Successo riproduttivo;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaveraili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

- ✓ **Numero massimo capi prelevabili**

SR	<1,2	1,2 ≤ >1,5	1,5 ≤ >2,5	≥ 2,5
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza post-riproduttiva dei maschi a fine estate.	Fino al 10% della consistenza totale dei maschi a fine estate.	Fino al 15% della consistenza totale dei maschi a fine estate.

Piani di prelievo Coturnice

Sono state inserite le seguenti nuove etichette:

- **Sezione Primaveraile:**
 - ✓ **Superficie di distribuzione** - dato non digitabile, fornito dalla Regione Piemonte
 - ✓ **Numero di maschi solo sentiti** - dato da imputare
 - ✓ **Numero totale di maschi contattati** - dato calcolato

✓ **Numero totale di uccelli** - dato calcolato

- **Sezione Estiva:**

✓ **Numero di maschi a fine estate** - dato calcolato

Sono stati modificati i seguenti calcoli:

- **Sezione Primaveraile**

- ✓ **Numero totale di maschi contattati** = numero di maschi soli + numero di maschi visti in coppia + numero di maschi solo sentiti + (numero uccelli indeterminati / 2)
- ✓ **Numero totale di uccelli** = numero di maschi soli + (numero di maschi visti in coppia * 2) + numero uccelli indeterminati + numero di maschi solo sentiti
- ✓ **Densità maschi** = (numero di maschi contattati / superficie totale censita) * 100

- **Sezione Estiva**

✓ **Numero maschi a fine estate**

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 2 * 0,8 \right] + \left[A * S_r * 0,9 \right]$$

Dove:

N_{tot} = Numero totale uccelli;

Nm_{prim} = Numero maschi contati a primavera;

$S_{primdis}$ = Superficie primaveraile di distribuzione (solo superficie venabile);

$S_{primind}$ = Superficie primaveraile indagata (solo superficie venabile);

S_r = Successo riproduttivo;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaveraili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

La sex ratio viene supposta pari a 1.

✓ **Numero massimo capi prelevabili**

SR	<1,0	1,0 ≤ >1,2	1,2 ≤ >2,0	≥ 2,0
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza totale a fine estate.	Fino al 10% della consistenza totale a fine estate.	Fino al 15% della consistenza totale a fine estate.

 DIREZIONE SERVIZI DIGITALI	NEMBO Portale Caccia Note operative	F411-NEMBO-GUI-079- 20260803_VU Pag. 6 di 7
---	---	--

Piani di prelievo Pernice bianca

Sono state inserite le seguenti nuove etichette:

- **Sezione Primaveraile:**
 - ✓ **Superficie di distribuzione** - dato non digitabile, fornito dalla Regione Piemonte
 - ✓ **Numero di maschi solo sentiti** - dato da imputare
 - ✓ **Numero di femmine viste sole** – dato da imputare
 - ✓ **Numero totale di maschi contattati** - dato calcolato
 - ✓ **Numero totale di uccelli** - dato calcolato
- **Sezione Estiva:**
 - ✓ **Numero di maschi a fine estate** – dato calcolato

Sono stati modificati i seguenti calcoli:

- **Sezione Primaveraile**
 - ✓ **Numero Totale di maschi contattati** = numero di maschi soli + numero di maschi visti in coppia + numero di maschi solo sentiti + (numero uccelli indeterminati/2)
 - ✓ **Numero totale di uccelli** = numero di maschi soli + numero di maschi solo sentiti + (numero di maschi visti in coppia* 2) + numero uccelli indeterminati + numero di femmine viste sole
 - ✓ **Densità maschi** = (numero di maschi contattati / superficie totale censita) * 100
- **Sezione Estiva**
 - ✓ **Numero maschi a fine estate**

$$N_{tot} = \left[Nm_{prim} * \left(\frac{Sprim_{dis}}{Sprim_{ind}} \right) * 2 * 0,8 \right] + [A * S_r * 0,9]$$

dove:

Ntot= Numero totale uccelli;
Nmprim= Numero maschi contati a primavera;
Sprimdis= Superficie primaveraile di distribuzione;
Sprimind= Superficie primaveraile indagata;
Sr= Successo riproduttivo;

0,8 e 0,9 sono fattori correttivi introdotti per tenere in considerazione la sopravvivenza degli adulti e dei giovani nel periodo che intercorre, rispettivamente, tra i censimenti primaveraili o quelli estivi e l'apertura della stagione venatoria ad ottobre.

- ✓ **Numero massimo capi prelevabili**

 CSI your digital partner DIREZIONE SERVIZI DIGITALI	NEMBO Portale Caccia Note operative	F411-NEMBO-GUI-079- 20260803_VU Pag. 7 di 7
--	--	---

SR	<0,3	$0,3 \leq 0,8$	$0,8 \leq 1,5$	$\geq 1,5$
Tipo di piano		conservativo	medio	alto
Proposta di piano	no caccia	Fino al 5% della consistenza a fine estate.	Fino al 10% della consistenza a fine estate.	Fino al 15% della consistenza a fine estate.